

# ทำอย่างไรเมื่อถูกกัด

เกิดจากเชื้อไวรัส

วิธีสังเกต

ชิมหรือดูดน้ำขี้

1 ล้างแผลด้วยน้ำกับสบู่หลายๆ ครั้ง  
ทำแผลด้วยแอลกอฮอล์และเบตาดีน



2 กักสัตว์ไว้เพื่อดูอาการ สอบถาม  
ประวัติการฉีดวัคซีนจากเจ้าของ



3 พบแพทย์ทันที  
(โดยเฉพาะหากถูกหมาจรจัดกัด)



## ระยะอาการ

# ระว่างพิษสุนัขบ้า

(ผู้ติดเชื้อมีการรักษาไม่ได้ ตายอย่างเดียว)

กัด

ข่วน

ระยะที่ 1

มีไข้ คล้ายไข้หวัด  
เบื่ออาหาร คันแผล

คน 2-3 วัน

ระยะที่ 2

มีอาการทางประสาท  
คลุ้มคลั่ง กลัวน้ำ  
กลัวลม ความรู้สึกไว

3-7 วัน

ระยะที่ 3

อัมพาต หายใจกระตุก  
คลุ้มคลั่ง ตาย

1-7 วัน

สัตว์ 2-3 วัน

1-7 วัน

1-10 วัน

ระยะที่ 1

อารมณ์เปลี่ยนแปลง  
ดุร้ายหรือซึมเศร้า

ระยะที่ 2

กระวนกระวาย  
ลิ้นห้อย น้ำลายไหล

ระยะที่ 3

อัมพาต ตาย

ป้องกันได้  
โดยพาไป  
ฉีดวัคซีน  
ทุกปี



www.raikoke-sao.go.th  
0-3279-0248

โรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานบริการสาธารณสุข สำนักงานปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

